

Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe e. V.

Am Knappenberg 73

44139 Dortmund

Tel: 0231 10877553

Mail: info@bundesverband-glaukom.de

www.bundesverband-glaukom.de



Augentropfen	Lagerung vor Öffnung	Lagerung nach Öffnung	Wirkstoffe	Phos- phate	Konser- vierung
Alphagan (Flasche)	bis 25°C, bei 2,5 ml 2 Jahre, bei 5 ml 3 Jahre	bis zu 25°C, 28 Tage	Brimonidin	nein	ja/BAC
Azarga (Flasche)	keine Gradangaben	keine Gradangaben, 28 Tage	Brinzolamid + Timolol	nein	ja/BAC
Azopt (Flasche)	keine Gradangaben	keine Gradangaben, 28 Tage	Brinzolamid	nein	ja/BAC
Bapiri (Flasche)	keine Gradangaben	bis 25 °C, 90 Tage	Bimatoprost + Timolol	ja	nein
Betoptima (Flasche)	bis 25°C, im Karton	bis 25°C, im Karton, 28 Tage	Betaxolol	nein	ja/BAC
BimatoTim- Vision (Flasche)	2 Jahre in der äußeren Verpackung.	keine Gradangaben, im Beutel 7 Tage, Rest nach Tropfen verwerfen	Bimatoprost	ja	ja/BAC
Bimato-Vision (Flasche)	keine Gradangaben	keine Gradangaben, 28 Tage	Bimatoprost	ja	ja/BAC
Bimato-Vision sine (EDOs)	keine Gradangaben, im Beutel, im Karton	keine Gradangaben, im Beutel, 7 Tage, Rest nach Tropfen verwerfen	Bimatoprost	ja	nein
Brimo-Vision (Flasche) . Brimozept (Flasche) . Brimonidin Stulln (Flasche)	keine Gradangaben	keine Gradangaben, 28 Tage	Brimonidin	nein	ja/BAC
Brimo Stulln sine (EDOs)	keine Gradangaben, im Karton	keine Gradangaben, im Beutel, 3 Monate, Rest nach Tropfen verwerfen	Brimonidin	nein	nein
Brimo-Vision sine (EDOs)	keine Gradangaben, im Karton	keine Gradangaben, im Beutel, 3 Monate, Rest nach Tropfen verwerfen	Brimonidin	nein	nein
Catiolanze (EDOs)	siehe Aufdruck auf Karton	nicht über 30°C, nach dem Öffnen im Beutel	Latanoprost	nein	nein
Clonid-Ophtal sine 1/8 (EDOs)	bis zu 25°C, im Karton	bis zu 25°C, Rest nach Tropfen verwerfen	Clonidin	ja	nein
Clonid-Ophtal (Flasche)	bis 25°C	bis 25°C, 42 Tage	Clonidin	ja	ja/BAC

Augentropfen	Lagerung vor Öffnung	Lagerung nach Öffnung	Wirkstoffe	Phos- phate	Konser- vierung
Cosopt (Flasche)	bis zu 25°C, 3 Jahre, im Karton	bis zu 25°C, 28 Tage, im Karton	Dorzolamid + Timolol	nein	ja/BAC
Cosopt S (EDOs)	bis zu 25°C, 30 Monate	bis 25°C, nach erstem Öffnen des Beutels 15 Tage, im Beutel	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
Cosopt sine (Flasche)	bis zu 30°C, im Folienbeutel	bis zu 25°C, 2 Monate	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
CosDuo (Flasche)	bis zu 30°C, 3 Jahre	bis 30°C, 28 Tage	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
Dimaz (Flasche)	2 Jahre	Flasche 5ml 60 Tage, 10ml 90 Tage	Dorzolamid	nein	nein
Dispatim sine 0,25%, 0,5% (EDOs)	bis zu 25°C, im Karton	bis zu 25°C, Rest nach Tropfen verwerfen	Timolol	ja	nein
Dorlazept (Flasche)	bis 30°C, 2 Jahre	bis 30°C, im Karton, 28 Tage	Dorzolamid	nein	ja/BAC
Dorzo-Vision (Flasche)	bis 30°C	bis 25°C, 30 Tage	Dorzolamid	nein	ja/BAC
Dorzo-Vision sine (EDOs)	bis 30°C, im Karton	bis 25°C, im Karton, 28 Tage	Dorzolamid	nein	nein
Dorzo comp. Vision sine (EDOs)	bis zu 25°C, im Karton	bis zu 25°C, Rest nach Tropfen verwerfen, nach Öffnen des Beutels 7 Tage	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
Dorzocomp- Stulln (EDOs)	bis 30°C, im Karton	bis 30°C, bei geöffnetem Beutel 3 Monate	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
Duokopt (Flasche)	2 Jahre	2 Monate	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
DuoTrav (Flasche)	2 Jahre, bis zu 25°C	bis zu 25°C, 28 Tage	Travoprost + Timolol	nein	ja/Polyquad
Elymbus (EDOs)	siehe Aufdruck auf Karton	1 Monat nach Öffnung des Folienbeutels	Bimatoprost +Carbomer	nein	nein
Fixaprost (EDOs)	2 Jahre, im Karton	28 Tage pro aufgerissenen Folienbeutel, im Folienbeutel, Rest nach Tropfen verwerfen.	Latanoprost + Timolol	nein	nein
Fotil (Flasche)	18 Monate, bei 2 bis 8 °C, im Karton	bis 25 °C, 28 Tage	Pilocarpin + Timolol	nein	ja/BAC
Fotil sine (EDOs)	2 Jahre, bei 2 bis 8 °C	Nach Anbruch des Schutzfolienbeutels: bei Raumtemperatur bis 25°C im Folienbeutel lichtgeschützt. Nach Öffnen des Folienbeutels 28 Tage verwendbar. Rest nach Tropfen verwerfen.	Pilocarpin + Timolol	nein	nein
Ganfort (Flasche)	bis zu 25°C, 2 Jahre	bis zu 25°C, 28 Tage	Bimatoprost + Timolol	nein	ja/BAC

Augentropfen	Lagerung vor Öffnung	Lagerung nach Öffnung	Wirkstoffe	Phosphate	Konservierung
Ganfort DU (EDOs)	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich, im Karton, 2 Jahre	Nach Entnahme aus Beutel 7 Tage	Bimatoprost + Timolol	ja	nein
Iopidine (Flasche)	bis 25°C, im Karton, nicht im Kühlschrank!, 3 Jahre	bis 25°C, im Karton, 28 Tage	Apraclonidin	nein	ja/BAC
Iricryn (Flasche)	2 Jahre	bis 25° C, 90 Tage	Bimatoprost	ja	nein
Latanomed comp. (Flasche) . Latano-ratio comp. (Flasche) . Latano Tim-Vision (Flasche) . Latano-Vision (Flasche)	bei 2-8°C im Kühlschrank und Karton, 3 Jahre	bis zu 25°C, 28 Tage	Latanoprost + Timolol	ja	ja/BAC
Lifog (Flasche)	Nicht über 25 °C lagern. Keine besonderen Lagerungshinweise	2,5ml 30 Tage haltbar; 7,5ml 90 Tage haltbar	Latanoprost	ja	nein
Lumigan 0,1 (Flasche)	keine Gradangaben, 2 Jahre	keine Gradangaben, 28 Tage	Bimatoprost	ja	ja/BAC
Lumigan 0,3 (EDOs)	Nicht über 25 °C lagern. Keine besonderen Lagerungshinweise	Nicht über 25 °C lagern. Keine besonderen Lagerungshinweise, Rest nach Tropfen verwerfen.	Bimatoprost	ja	nein
Monoprost (EDOs)	2 Jahre in der äußeren Verpackung. Bis zu 25°C	Nach dem ersten Öffnen des Beutels: die Einzeldosisbehälter innerhalb von 10 Tagen verwenden. Bis 25°C, Rest nach Tropfen verwerfen.	Latanoprost	nein	nein
Pilomann 1%, 2% (Flasche)	bis zu 25°C, im Karton, 3 Jahre	bis zu 25°C, 42 Tage, im Karton	Pilocarpin	nein	ja/BAC
Roclanda (Flasche)	3 Jahre, bei 2-8°C, im Karton	bis 25°C, 28 Tage, im Karton	Latanoprost + Netarsudil	nein	ja/BAC
Simbrinza (Flasche)	2 Jahre	keine Gradangaben, 28 Tage, im Karton	Brinzolamid + Brimonidin	nein	ja/BAC
Spersacarpin 0,5%-2% (Flasche)	bis 25°C, im Karton	bis 25°C, im Karton, 28 Tage	Pilocarpin	nein	ja/BAC
Taflotan (Flasche)	bis zu 25°C, im Karton, 3 Jahre	bis zu 25°C, 28 Tage, im Karton	Tafluprost	ja	ja/BAC

Augentropfen	Lagerung vor Öffnung	Lagerung nach Öffnung	Wirkstoffe	Phosphate	Konservierung
Taflotan sine (EDOs)	bei 2-8°C, 3 Jahre	bis zu 25°C, im Folienbeutel, Rest nach Tropfen verwerfen	Tafluprost	ja	nein
Tafluprost santen (EDOs)	bei 2-8°C, 3 Jahre	bis 25°C, im Folienbeutel, Rest nach Tropfen verwerfen	Tafluprost	ja	nein
Taptiqom (EDOs)	3 Jahre, bei 2-8°C	bis 25°C, im Folienbeutel, Rest nach Tropfen verwerfen	Tafluprost + Timolol	ja	nein
Tavu (Flasche)	3 Jahre, bei 2-8°C	bis 25°C, 28 Tage, im Karton	Latanoprost + Timolol	ja	ja/BAC
Tidimaz	2 Jahre	Flasche 5ml 60 Tage, 10ml 90 Tage, nicht über 25 Grad	Dorzolamid + Timolol	nein	nein
Timolol	bei Timolol-AT schwanken die Angaben. Aber man ist auf der sicheren Seite, wenn man sie bis zu 25°C im Karton aufbewahrt. Ansonsten bitte im BPZ	Auch hier schwanken die Angaben. Sicher ist bis zu 25°C, 28 - 42 Tage, im Karton eine gute Lagerung. Ansonsten bitte im BPZ genau lesen!	Timolol	ja	
Timo-Comod 0,1%, 0,25%, 0,5% (Flasche)	bis zu 25°C, 3 Jahre	bis zu 25°C, 12 Wochen.	Timolol	ja	nein
Travatan (Flasche)	bis zu 25°C, 2 Jahre	bis zu 25°C, 28 Tage	Travoprost	nein	ja/Polyquad
TravoTim-Vision (Flasche)	3 Jahre, im Karton	28 Tage nach Anbruch	Travoprost + Timolol	nein	ja/BAC
Travo-Vision (Flasche)	3 Jahre, im Karton	28 Tage, im Karton	Travoprost	nein	ja/BAC
Travo-Vision sine (EDOs)	keine Gradangaben	bis 30°C, im Beutel und Karton	Travoprost	nein	nein
Trusopt (Flasche)	3 Jahre	28 Tage, im Karton	Dorzolamid	nein	ja/BAC
Trusopt S (EDOs)	bis zu 30°C, im Folienbeutel, 30 Monate	bis zu 30°C, 15 Tage pro aufgerissenen Folienbeutel, im Folienbeutel, Rest nach Tropfen verwerfen.	Dorzolamid	nein	nein
Vistagan o. K. (EDOs)	bis zu 25°C, im Karton, 18 Monate	bis zu 25°C, im Karton, Rest nach Tropfen verwerfen.	Levobunolol	ja	nein
Xalacom (Flasche)	bei 2-8°C im Kühlschrank und Karton	bis zu 25°C, 28 Tage, im Karton	Latanoprost + Timolol	ja	ja
Xalatan (Flasche)	bis 25°C, im Karton, 2 Jahre	bis zu 25°C, 28 Tage, im Karton	Latanoprost	ja	ja/BAC
Genannte Produkte sind eingetragene Warenzeichen!					
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit!					
Grundsätzlich empfiehlt es sich immer, den Beipackzettel (BPZ) zu lesen, da dort wichtige Angaben zu den Tropfen stehen. Das empfiehlt sich gerade auch für die Generika-Tropfen, die es inzwischen vielfältig gibt und die hier nicht alle einzeln aufgeführt werden können.					
Da empfiehlt es sich einen Wirkstoffvergleich im jeweiligen BPZ zu machen.					

© Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe e. V. Dortmund, Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung!			
---	--	--	--

Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge ohne Wertung.			
--	--	--	--

Stand: August 2025	BAC = Benzalkoniumchlorid	EDOs = Einzeldosen	
--------------------	---------------------------	--------------------	--